

## Pâturage boisé (618)

SPB (qualité niv. 1 selon OPD)	Réseau écologique	Qualité écologique de niveau 2 selon OPD
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Aucune fumure minérale azotée. Les engrais de ferme, compost et engrais minéraux non azoté peut faire l'objet d'une autorisation des autorités cantonales (ENV)</li> <li>- L'utilisation de produits phytosanitaires doit faire l'objet d'une autorisation des autorités cantonales (ENV – forêts).</li> <li>- Pâturage une fois par an au minimum</li> <li>- Coupe de nettoyage autorisée</li> <li>- Broyage interdit</li> <li>- Pas d'apport de fourrage d'appoint sur le pâturage</li> <li>- <b>Les structures non productives (en dehors des arbres) favorisant la biodiversité sont prises en compte à concurrence de 1% maximum de la surface herbagère sans déduction de la SAU</b></li> <li>- Exclusion si 20% de la surface avec Ray-grass, Vulpin des prés, Dactyle, Pâturin des prés et commun, Renoncule âcre et rampante, trèfle blanc</li> <li>- Exclusion si 10% de la surface avec Rumex, Chénopode Bon-Henri, Ortie, Chardon</li> <li>- Un réensemencement est possible pour améliorer la qualité florale, avec demande d'autorisation</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Maintenir ou installer des éléments de structure: buissons indigènes, têtes de roche, tas de bois, tas de pierres, souches</li> <li>- Les structures installées doivent être réparties sur l'ensemble du pâturage</li> <li>- Tas de bois / cailloux tous les 50 m demandés dans les pâturages secs et riches en flore selon les indications inscrites sur le contrat du réseau écologique</li> <li>- Maintenir la présence de refus (pas de fauche systématiques sur toute la surface)</li> <li>- Broyage des ligneux est toléré (autorisé du 1<sup>er</sup> août au 31 mars)</li> </ul> <p>Recommandations(s)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pour les structures buissonnantes, favoriser les épineux</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Présence régulière de plantes indicatrices et de structures.</li> </ul>

**Réseau Ecologique Vallée de la Sorne. Période 2018-2025.**

<p><b>Plantes indicatrices</b></p>	<p><i>Sanguisorba minor</i> (Petite sanguisorbe)  <i>Thymus serpyllum</i> (Thym)  <i>Polygala sp.</i> (Polygales)  <i>Carlina acaulis</i> (Carline)  <i>Hieracium pilosella</i> (Epervière piloselle)  <i>Gentiana sp.</i> (gentianes)  <i>Gentiana lutea</i> (Grande gentiane)</p>
<p><b>Espèces concernées</b></p>	<p><i>Lepus europaeus</i> (Lièvre brun)  <i>Lanius collurio</i> (Pie grièche écorcheur)  <i>Saxicola torquata</i> (Tariet pâtre)  <i>Carduelis cannabina</i> (Linotte mélodieuse)  <i>Carduelis carduelis</i> (Chardonneret élégant)  <i>Picus viridis</i> (Pic vert)  <i>Brintesia circe</i> (Silène)  <i>Euphradrias a. aurinia</i> (Damier de la Succise)  <i>Melanargia galathea</i> (Demi-Deuil)  <i>Apis mellifera/Osmis cornuta/ Eucera nigriscens</i> (Abeilles mellifères et sauvages)  <i>Lacerta agilis</i> (Lézard des souches)  <i>Coronella austriaca</i> (Coronelle lisse)</p>
<p><b>Justification de la mesure</b></p>	
<p>Ce type de surface offre une grande diversité florale qui attire de nombreux insectes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Silène: ne vit que dans les terrains secs (PPS), hiberne dans l'herbe haute, <b>besoin de structures (tas de bois/cailloux) tous les 50 m, PPS à mettre sous contrat LPN,</b></li> <li>- Demi-Deuil: aime les prairies riches en fleurs, œufs déposés dans l'herbe haute,</li> <li>- Lièvre: trouve des refuges pour s'abriter et abriter sa progéniture,</li> <li>- Pie grièche écorcheur: chasse dans ce milieu lorsqu'il est situé à proximité de haie ou de bocage,</li> <li>- Rouge queue à front blanc: chasse dans ce milieu lorsqu'il est situé à proximité de vergers.</li> <li>- Les zones de refus sont des sites de nidifications potentiels pour les Tariers.</li> </ul>	

Version : Vallée de la Sorne, novembre 2017