

## Haie, bosquet champêtre et berge boisée (852)

SPB (Qualité niv. 1 selon OPD)	Réseau écologique	Qualité écologique de niveau 2 selon OPD
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Aucune fumure ni produit phytosanitaire</li> <li>- Entretien à faire durant la période de repos de la végétation, au moins tous les 8 ans, par tronçons maximum 1/3 de la surface</li> <li>- Bande herbeuse de 3 à 6 m de large des deux côtés de la haie (un seul côté si en limite de SAU, de route, de chemins, de murs ou de cours d'eau)</li> <li>- Fauche de la bande herbeuse, au moins une fois tous les 3 ans, exportation du produit de fauche obligatoire, broyage interdit et utilisation (fauche et pâture) comme les prairies extensives</li> <li>- Dans les pâturages, utilisation de la bande herbeuse au plus tôt comme dans les prairies extensives</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Entretien de la partie boisée en période de repos de la végétation (de préférence de novembre à mars, interdit du 1<sup>er</sup> avril au 31 juillet), en suivant les recommandations de la brochure d'Agridea « Comment planter et entretenir les haies » (2015). La taille doit se faire de manière sélective en favorisant les espèces à croissance lente, les espèces à petits fruits et les épineux pour former une strate arbustive dense</li> <li>- Aménagement de tas de bois ou de pierre tous les 50 m de préférence côté sud de l'objet</li> <li>- Bande herbeuse de 5 m minimum et des deux côtés de la haie</li> <li>- Maintien de 50% de la bande herbeuse sur pied uniquement lors de la 1<sup>ère</sup> utilisation (possibilité de faucher toute la bande herbeuse lors de la 2<sup>ème</sup> utilisation)</li> <li>- Intervalle entre la 1<sup>ère</sup> et la 2<sup>ème</sup> utilisation de min. 7 semaines</li> <li>- Utilisation du conditionneur est proscrite lorsqu'il n'est techniquement pas possible de le déclencher</li> <li>- Epareuse est proscrite en faveur des outils à coupe franche (sécauteur ou cisaille) Epareuse est proscrite en faveur des outils à coupe franche (sécauteur ou cisaille)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Uniquement des espèces d'arbres et de buissons indigènes</li> <li>- Largeur du boisé de 2 m minimum</li> <li>- 5 espèces d'arbres ou de buissons différents par 10 m courants sinon présence majoritairement de buissons épineux</li> <li>- 20% d'épineux sinon 1 arbre caractéristique par 30 m courant (circonférence du tronc au min. 1.7 m à 1,50 m du sol)</li> <li>- 50% de la bande herbeuse maintenu non-fauché ou non-pâturé à chaque opération</li> <li>- Conditionneur proscrit</li> <li>- Minimum 6 semaines entre l'utilisation des 2 moitiés de bande herbeuse. Maximum 2 utilisations par moitié (pâture d'automne compte comme une utilisation) en respectant toujours l'intervalle de 6 semaines entre l'utilisation de chaque moitié.</li> </ul>

## Réseau Ecologique : Vendline-Coeuvatte. Période 2018-2025

<b>Plantes indicatrices</b>	<i>Prunus spinosa</i> (Epine noir) <i>Crataegus sp</i> (Aubépine) <i>Prunus mahaleb</i> (Faux merisier) <i>Lonicera sp</i> (Chèvrefeuille) <i>Cornus sp</i> (Cornoullier) <i>Quercus sp</i> (Chêne) <i>Carpinus betulus</i> (Charme) <i>Prunus avium</i> (Cerisier sauvage)
<b>Espèces concernées</b>	<i>Lepus europaeus</i> (Lièvre brun) <i>Lanius collurio</i> (Pie grièche écorcheur) <i>Saxicola rubetra</i> (Tarier des prés) <i>Saxicola torquata</i> (Tarier pâtre) <i>Carduelis cannabina</i> (Linotte mélodieuse) <i>Carduelis carduelis</i> (Chardonneret élégant) <i>Sylvia communis</i> (Fauvette grisette) <i>Brintesia circe</i> (Silène) <i>Euphradrias a. aurinia</i> (Damier de la Succise) <i>Melanargia galathea</i> (Demi-Deuil) <i>Apis mellifera/Osmis cornuta/ Eucera nigriscens</i> (Abeilles mellifères et sauvages) <i>Lacerta agilis</i> (Lézard des souches) <i>Coronella austriaca</i> (Coronelle lisse)
<b>Justification de la mesure</b>	
<p>Ce type de surface offre un habitat, un abri ou un perchoir à de nombreuses espèces:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Lièvre: trouve des refuges pour s'abriter et abriter sa progéniture,</li><li>- Pie grièche écorcheur: vit dans ce milieu, l'utilise comme garde-manger (lardoirs),</li><li>- Les bandes herbeuses sont des tampons grouillant de vie entre la partie boisée et la surface agricole.</li></ul>	

Version : Vendline-Coeuvatte, mai 2019