

## Pâturage boisé (618)

| SPB (qualité niv. 1 selon OPD)   | Réseau écologique   | Qualité écologique niveau 2 selon OPD   |
|--|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aucun engrais minéral azoté. Les apports d'engrais de ferme, compost et engrais minéraux non-azotés peuvent faire objet d'autorisation des autorités cantonales (ENV).</li> <li>- Traitements herbicides plante-par-plante tolérés s'il n'est pas possible de les combattre raisonnablement par des moyens mécaniques.</li> <li>- L'utilisation de produits phytosanitaires doit faire l'objet d'une autorisation des autorités cantonales (ENV – forêts).</li> <li>- Pâturage une fois par an au minimum. Pas d'apport de fourrage d'appoint sur le pâturage</li> <li>- Coupe de nettoyage autorisée, mais broyage de l'herbe interdit.</li> <li>- Les structures non productives (en dehors des arbres) favorisant la biodiversité sont prises en compte à concurrence de 1% maximum de la surface herbagère sans déduction de la SAU</li> <li>- Exclusion si 10% de la surface avec Rumex, Chénopode Bon-Henri, Ortie, ou Chardon.</li> <li>- Un réensemencement est possible pour améliorer la qualité florale, sur autorisation</li> <li>- Exclusion si 20% de la surface avec Ray-grass, Vulpin des prés, Dactyle, Pâturin des prés et commun, Renoncule âcre et rampante, trèfle blanc.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Maintenir ou installer des éléments de structure: buissons indigènes, têtes de roche, tas de bois, tas de pierres, souches (1 % de structures).</li> <li>- Les structures installées doivent être réparties sur l'ensemble du pâturage</li> <li>- Maintenir des refus (ne pas les faucher systématiquement sur toute la surface)</li> <li>- Broyage des ligneux est toléré (autorisé du 1<sup>er</sup> août au 31 mars)</li> </ul> <p><i>Recommandations</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pour les structures buissonnantes, favoriser les épineux</li> <li>- Tas de bois / cailloux tous les 100 m dans les pâturages secs et riches en flore selon contrat réseau écologique (voir page suivante)</li> <li>- Abreuvoirs et mares : empêcher le piétinement de quelques mètres carrés permettant le développement d'un patch de végétation humide.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Min. 20 % de la surface du pâturage présente une qualité floristique (6 espèces indicatrices)</li> <li>- Taux de boisement minimum 10 %</li> <li>- Au moins 2.5% des éléments ligneux sont à dominante épineuse (&gt;20% d'épineux) ou sont riches en espèces (5 espèces)</li> <li>- Renouvellement suffisant (min. 5 éléments de régénération par ha, bien répartis sur la surface)</li> <li>- Présence régulière de structures.</li> </ul> |

**Réseau écologique des Franches-Montagnes : Période 2018-2025.**

|   |   |
|---|---|
| <b>Localisation</b>   |   |
|    | <p>Parcelles situées en périphérie des plaines cultivées, sur les versants peu pentus, sur les crêtes, etc.</p>   |
| <b>Plantes indicatrices</b>   |   |
|    | <p><i>Sanguisorba minor</i> (Petite sanguisorbe)<br/> <i>Thymus serpyllum</i> (Thym)<br/> <i>Polygala sp.</i> (Polygales)<br/> <i>Carlina acaulis</i> (Carline)<br/> <i>Hieracium pilosella</i> (Epervière piloselle)<br/> <i>Gentiana sp.</i> (gentianes)<br/> <i>Gentiana lutea</i> (Grande gentiane)</p>   |
| <b>Espèces cibles concernées</b>  |   |
|    | <p><i>Euphradrias a. aurinia</i> (Damier de la Succise)<br/> <i>Brenthis ino</i> (Nacré de la sanguisorbe)<br/> <i>Lepus europaeus</i> (Lièvre brun)<br/> <i>Brintesia circe</i> (Silène)<br/> <i>Tetrix undulata</i> (Tétrix forestier)<br/> <i>Coenagrion hastulatum</i> (Agrion hasté)<br/> <i>L. pectoralis</i> (Leucorrhine à gros thorax)</p> |
| <b>Justification de la mesure</b>   |   |
| <p>Le pâturage boisé des Franches-Montagnes possède souvent une haute valeur en biodiversité car des biotopes humides et secs peuvent être présents côte à côte (sec en sommet de talus, humide en pied de talus). De telles surfaces forment des relais très favorables dans le réseau !</p> <p>Le damier de la succise se reproduit sur la succise des prés, mais peut également le faire sur les grandes gentianes jaunes.</p> <p>Silène: ne vit que dans les terrains secs (PPS), hiberne dans l'herbe haute, <b>besoin de structures (tas de bois/cailloux) tous les 100 m, PPS à mettre sous contrat LPN</b></p> <p>Lièvre: trouve des refuges pour s'abriter et abriter sa progéniture.</p> <p>Le tétrix forestier a besoin d'endroits humides mais non boisés, voire légèrement ensoleillés.</p> <p>Les larves de libellules ont besoin de végétation non piétinée à proximité des points d'eau pour pouvoir atteindre l'âge adulte.</p> <p>Les saules sont intéressants pour d'autres papillons (aussi abeilles, etc.) mais ne doivent pas couvrir toute la surface.</p> |   |

***Réseau écologique des Franches-Montagnes : Période 2018-2025.***

Version : Franches-Montagnes, janvier 2018