Pâturage extensif (localisé dans la SAU)

OPD (résumé de la fiche technique "Compensation écologique dans l'exploitation agricole")	OQE Réseau	OQE "Qualité"
<ul style="list-style-type: none"> - Aucune fumure importée ni produit phytosanitaire (uniquement traitement plante par plante pour les plantes à problèmes, s'il est impossible de les combattre raisonnablement par des moyens mécaniques) - Pâture une fois par an au minimum - Coupe de nettoyage autorisée - Pas d'apport de fourrage d'appoint sur le pâturage - Minimum 20 ares / parcelle d'un seul tenant - Exclusion si 20% de la surface avec Ray-grass, Vulpin des prés, Dactyle, Pâturin des prés et commun, Renoncule âcre et rampante, trèfle blanc - Exclusion si 10% de la surface avec Rumex, Chénopode Bon-Henri, Ortie, Chardon 	<ul style="list-style-type: none"> - Seuls les pâturages avec structure (min. 5%) seront pris dans le réseau - Assurer la présence de refus - Aménagement des tas de bois/cailloux demandé si pâturage séchard et riche en flore <p>Recommandations(s)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Un réensemencement est possible pour améliorer la qualité florale, avec demande d'autorisation - Obtenir la qualité florale OQE - La présence d'herbe rase sur les sols peu épais est intéressante ponctuellement 	<ul style="list-style-type: none"> - Évaluation de la floristique à l'aide d'une liste d'espèces indicatrices : pour atteindre la qualité minimale requise, la surface doit abriter 6 espèces indicatrices - Si le pâturage extensif présente sur au moins 20% de la surface une flore avec qualité, les structures seront évaluées : <ul style="list-style-type: none"> • 10 – 40% d'éléments de structures y compris 5% au minimum de structures ligneuses d'une valeur écologique particulière (5 espèces différentes et/ou 20% d'arbustes épineux, y c. les ronces) • une structure ligneuse et une structure paysagère

Plantes indicatrices	<i>Sanguisorba minor</i> (Petite sanguisorbe) <i>Thymus serpyllum</i> (Thym) <i>Polygala sp.</i> (Polygales) <i>Carlina acaulis</i> (Carline) <i>Hieracium pilosella</i> (Epervière piloselle) <i>Gentiana sp.</i> (gentianes) <i>Gentiana lutea</i> (Grande gentiane)
Espèces cibles	<i>Euphydryas aurinia</i> (Damier de la Succise) <i>Stenobothrus stigmaticus</i> (Sténobothre nain) <i>Brintesia circe</i> (Silène) <i>Melanargia galathea</i> (Demi-Deuil) <i>Aporia crataegi</i> (Gazé) <i>Stenobothrus lineatus</i> (Criquet de la Palène) <i>Lepus europaeus</i> (Lièvre brun) <i>Mustella ermina</i> (Hermine) <i>Lanius collurio</i> (Pie grièche écorcheur) <i>Coronella austriaca</i> (Coronelle lisse)
Justification de la mesure	
<p>Ce type de surface offre une grande diversité florale qui attire de nombreux insectes:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Silène: ne vit que dans les terrains secs (PPS), hiberne dans l'herbe haute, besoin de structures (tas de bois/cailloux) tous les 50 m, PPS à mettre sous contrat LPN, - Lièvre: trouve des refuges pour s'abriter et abriter sa progéniture, - Hermine: chasse dans ce milieu lorsqu'il est situé à proximité de haie ou de bocage, besoin de structures (tas de bois/cailloux) tous les 50 m en bordure de haie/bocage, - Pie grièche écorcheur: chasse dans ce milieu lorsqu'il est situé à proximité de haie ou de bocage, 	

Version : janvier 2013